

Ästhetische Brustchirurgie

Das Symbol der Sinnlichkeit

Die Brust ist der Inbegriff von Weiblichkeit und Sinnlichkeit. corrige luzern bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihre Brust perfekt auf Ihren Körper abzustimmen:

- Vergrößerung mit Implantat
- Vergrößerung mit Eigenfett
- Straffung
- Verkleinerung
- Korrektur der Form (Asymmetrie)

Mammaaugmentation (Brustvergrößerung) mit Implantat

Bei der Mammaaugmentation mit Implantaten aus Silikon werden diese entweder über oder unter dem Brustmuskel platziert. Der Eingriff dauert etwa zwei Stunden und wird unter Vollnarkose durchgeführt. Über einen kleinen Hautschnitt in der Unterbrustfalte wird das Implantat eingebettet. Im Anschluss wird die Haut mit selbstauflösenden Fäden genäht.

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Implantatsformen, rund und tropfenförmig. Das tropfenförmige Implantat kommt der natürlichen Brustform sehr ähnlich. Das Endergebnis hängt jedoch stark von der Anatomie des Körpers ab. Grösse und Form des Implantats werden individuell auf die Patientin und ihre Körperform abgestimmt.

Nach dem Eingriff sollte für mindestens eine Woche nicht gearbeitet werden. Berufstätige, die ihre Arme stark belasten, sollten für drei bis vier Wochen auf die Ausführung ihrer Tätigkeit verzichten. Sport kann nach etwa vier Wochen wieder betrieben werden. Nach dem Eingriff sollte für etwa sechs Wochen ein Sport-BH getragen werden. Das endgültige Endresultat der Brustvergrößerung stellt sich nach sechs bis neun Monaten nach der Operation ein. Nach diesem Zeitraum ist die Schwellung vollständig zurückgegangen und das Implantat ist in die endgültige Position gelangt. Über mögliche Risiken berät Sie Dr. Rüegg in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Mammaaugmentation (Brustvergrößerung) mit Eigenfett

Für die Brustvergrößerung mit Eigenfett werden vorhandene Fettdepots im Körper abgesaugt. Das Eigenfett wird im Anschluss aufbereitet und an mehreren Stellen rund um die Brust injiziert.

Ein Teil des Fettes wird vom Körper resorbiert, somit sind oftmals mehrere Sitzungen nötig. Die Methode der Brustvergrößerung mit Eigenfett eignet sich besonders für Patientinnen, die eine kleine bis mässige Vergrößerung wünschen und keine besonderen Risiken für Brustkrebs tragen. Welche Behandlungsmöglichkeit für Sie und Ihren Körper ideal ist, wird in einem ausführlichen Beratungsgespräch erörtert. Die Operation wird unter Vollnarkose durchgeführt und dauert etwa ein bis zwei Stunden. Im Anschluss wird für etwa sechs Wochen ein Sport-BH getragen. Die berufliche Tätigkeit sollte für etwa eine Woche ausgesetzt werden.

Mastopexie (Bruststraffung)

Hat die Brust infolge von Alter an Form verloren oder entstehen nach einer Schwangerschaft oder Gewichtsverlust sogenannte leere, schlaffe Brüste, können diese gestrafft werden. Hierbei wird die Brust neu modelliert und überschüssige Haut entfernt. Die Operation erfolgt unter Vollnarkose. Je nach Patientin wird der Brustwarzenhof verkleinert oder neu positioniert. Ebenfalls wird das Brustdrüsengewebe neu geformt. Die Narbe liegt um den Brustwarzenhof sowie senkrecht nach unten und in der Unterbrustfalte. Die Haut wird mit selbstauflösenden Fäden genäht. Nach der Operation wird für etwa sechs Wochen ein Sport-BH getragen. Die endgültige Form der Brüste zeigt sich nach etwa sechs bis neun Monaten. Nach dem Eingriff sollte für ein bis zwei Wochen auf die berufliche Tätigkeit verzichtet werden. Sportliche Aktivitäten sind nach vier bis sechs Wochen möglich.

Mammareduktion (Brustverkleinerung)

Leiden Patientinnen unter körperlichen Beschwerden aufgrund einer zu grossen Brust, kann diese operativ verkleinert werden. Hierfür werden Haut, Brustdrüsen- und Fettgewebe entfernt. Die Narbe liegt um den Brustwarzenhof sowie senkrecht nach unten und in der Unterbrustfalte. Die Haut mit selbstauflösenden Fäden genäht. Mit dem verbleibenden Gewebe wird die Brust neu geformt. Die Operation dauert etwa zwei bis drei Stunden und wird unter Vollnarkose durchgeführt, mit einem Spitalaufenthalt von drei bis vier Tagen. Nach der Operation wird für ein bis zwei Tage eine Wunddrainage gelegt, anschliessend für sechs Wochen ein stützender Sport-BH getragen. Nach dem Eingriff sollte für ungefähr 2 Wochen nicht gearbeitet werden. Berufstätige, die ihre Arme stark belasten, sollten für drei bis vier Wochen auf die Ausführung ihrer Tätigkeit verzichten. Sport kann nach etwa vier Wochen wieder betrieben werden. Das endgültige Endresultat der Brustverkleinerung stellt sich nach sechs bis neun Monaten nach der Operation ein. Nach diesem Zeitraum ist die Schwellung vollständig zurückgegangen. Über mögliche Risiken berät Sie Dr. Rüegg in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Korrektur der Form (Asymmetrie)

Ist die Brust unterschiedlich gross oder unterschiedlich geformt, kann sie mithilfe einer Bruststraffung oder einseitigen Vergrößerung bzw. Verkleinerung korrigiert werden. Welche Behandlungsmöglichkeit für Sie und Ihren Körper ideal ist, wird in einem ausführlichen Beratungsgespräch erörtert.

Diese Informationen sollen Ihnen einen Überblick über unser Leistungsspektrum geben. Sie ersetzen jedoch kein persönliches Beratungsgespräch. Jeder Körper ist individuell und benötigt eine perfekt abgestimmte Behandlung. Ob eine Korrektur mit Implantat oder Eigenfett für Sie in Frage kommt, wird gemeinsam anhand unterschiedlicher Faktoren entschieden.